



Catálogo de
PRODUTOS



LINHA DE MEDICAMENTOS

ARTRIN

Artrin é um medicamento indicado para o tratamento de artrose, artrite, osteocondroartrose, espondilose, espondiloartrose anquilosante, processos degenerativos articulares e tendinosos. E auxilia como tratamento inicial na calcificação dos discos intervertebrais e como ajuda terapêutica na reparação de fraturas.

Apresentação: Embalagem com 30 comprimidos palatáveis e bissulcados.

Modo de usar:

- Cães e gatos até 5 kg: 1/4 comprimido uma vez ao dia;
- Cães e gatos de 5 a 15 kg: 1/2 comprimido uma vez ao dia;
- Cães de 15 a 60 kg: 1 comprimido uma vez ao dia.



5 kg = 1/4



5/15 kg = 1/2



15/60 kg = 1Cp

TIPER C

Antipulgas, carrapaticida e repelente de moscas de ponta de orelha e mosquitos. É um inseticida de contato, apresenta efeito "hot foot", ou seja, esquenta e irrita as patas dos parasitas externos e insetos, promove destruição do SNC acabando com os parasitas e insetos antes que eles piquem o animal, dessa forma se evita a DAPP (Dermatite alérgica a picada de pulga). Funciona como preventivo e controle de miíases, pois afasta as moscas. Período residual: 30 dias contra pulgas e carrapatos e 21 dias de repelência contra moscas e mosquitos.

Modo de usar: Como repelente de mosca da ponta da orelha: colocar duas gotas na ponta de cada orelha. O restante do conteúdo pode ser aplicado no dorso do animal.

Como preventivo de miíases: colocar ao redor das feridas (acidentais ou cirúrgicas) uma gota cada 2 (dois) centímetros.

Como controle de miíases: colocar na ferida uma quantidade suficiente do produto de modo que o mesmo faça contato com as larvas. Indicado para cães a partir de 8 semanas.

- Cães até 15 kg: 1 Pipeta com 1,2 ml.
- Cães com mais de 15 kg até 45 kg: 1 Pipeta com 4 ml.

Apresentação: Pipeta com 1,2 e 4 ml.

BROUWER



COMPOSIÇÃO

Cada comprimido palatável contém:	
Glucosamina Sulfato.....	500 mg
Condroitín Sulfato.....	100 mg
Manganês.....	10 mg
Excipientes c.p.s.....	2000 mg

INDICAÇÃO



COMPOSIÇÃO

Permetrina	50 g
Excipientes cps	100 ml



Até 15 kg = 1,2 mL



15 a 45 kg = 4 mL

LINHA DE MEDICAMENTOS

TALCO ANTIPULGAS E CARRAPATICIDA CG

Talco pulgicida e carrapaticida da Brouwer, é um produto a base de Carbaril 5.0 g, indicado no combate de ectoparasitas em cães e gatos. Possui em sua fórmula agentes necessários à prevenção e tratamento de pulgas, carrapatos.

Modo de usar: Polvilhar sobre animais a partir de 1 mês de idade, massagear a contrapelo para que penetre até a pele. Se necessário, repetir o tratamento uma vez por semana. Para melhor controle biológico das pulgas e dos carrapatos, é conveniente tratar os lugares onde habitualmente os animais dormem e, se possível, o resto do ambiente.

Apresentação: Frasco com 100 g.

BROUWER



COMPOSIÇÃO

Carbaril	5 g
Talco q.S.P	100 g

ENROXINA 150

Enroxina 150 mg é um antibiótico de amplo espectro para cães e gatos, contra bactérias Gram positivas e Gram negativas. Indicado para o tratamento das infecções do aparato respiratório, digestivo, reprodutor, urinário e pele.

A enrofloxacinina é ativa contra as bactérias *Escherichia Coli*, *Salmonella spp*, *Proteus spp*, *Klebsiella spp*, *Pseudomona spp*, *Bordetella spp*, *Brucella canis*, *Estafilococo spp*; *Streptococo spp*, *Corenebacterium spp* e *Mecoplasmas*.

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos trissulcado.

Modo de usar: Em cães e gatos, a dose diária a ser administrada é de 5 mg/kg, correspondente a 1 comprimido a cada 30 kg. O tempo médio recomendado de administração é de 5 dias, mas o tratamento pode se estender por até 10 dias. E nos casos de infecções crônicas, recorrentes e em afecções dermatológicas pode chegar a 20 dias ou mais a critério do médico veterinário. Pode administrar-se a cada 12 ou 24 horas de acordo com a patologia e a criterio do médico veterinário.



COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Enrofloxacinina	150 mg
Excipientes cps.....	400 mg



5 kg = 1/3



10/15 kg = 2/3



15/30 kg = 1Cp

LINHA DE MEDICAMENTOS

NEUROALIVIO

Neuroalivio canino é um modificador dos transtornos da conduta animal, provocados pelos estados de ansiedade leve ou moderada como:

Agressão dominante ou por medo que se manifesta, como por exemplo ansiedade de separação, transtornos compulsivos, agressão dominante ou por medo, transtornos de adaptação.

Modo de usar: Cães 2 a 4 mg/kg por dia, dose dividida em duas vezes, com 12 horas de intervalo, ou seja 1 a 2 mg/kg a cada 12 horas. Sempre começar o tratamento com a dose mínima e reavaliar a cada 15 dias a necessidade de ajuste de dose. A Buspirona precisa de aproximadamente 15 dias para atuar plenamente como modulador da serotonina a nível cerebral, portanto a resposta clínica esperada é crescente em forma paulatina e se faz evidente para o proprietário a partir dos 15 a 30 dias após o início do tratamento. A dose aqui indicada é orientadora e é a que gera resposta na maioria dos casos. A duração do tratamento dependerá da causa clínica e da resposta do paciente à medicação.

Apresentação: Frasco com 30 comprimidos palatáveis bissulcados de 40 mg.

BROUWER



INDICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido palatável contém:

Buspirona.....	40,0 mg
Excipientes c.p.s.....	2000,0 mg

LINHA DE MEDICAMENTOS

VETCOPAN

Antiparasitário interno de amplo espectro para cães. É indicado para o tratamento e controle das principais endoparasitoses de caninos causadas por vermes gastrointestinais.

O espectro de ação inclui os seguintes parasitas: *Ancylostoma caninum*, *Diphylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Trichuris vulpis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*. Protozoários: *Giardia spp.*

Modo de usar: Administre por via oral, 1 comprimido a cada 10 kg de peso, a partir de 4 semanas de vida. Comprimidos bissulcados, seguro para cadelas prenhez no terço final de gestação.

Obs: Para tratamento de Giardíase, administrar um comprimido por dia para cada 10 kg de peso, administrar durante 3 dias consecutivos.

Apresentação: Caixa com 4 comprimidos bissulcados.



5 kg = 1/2



10 kg = 1Cp



20 kg = 2Cp



COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém:

Fenbendazol	500 mg
Pamoato de pirantel	150 mg
Praziquantel	50 mg
Excipientes q.S.P 1 comprimido 1.000mg	



AMOXIGUARD

Antibiótico de amplo espectro. É eficaz contra bactérias Gram positivos, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Haemophilus*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Bacillus*, *Actinomyces*, germes Gram negativos, *Coli*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*

Modo de usar: Os comprimidos podem ser administrados inteiros, partidos ou triturados, diretamente na boca do animal ou misturados a alimentos, 10 mg/kg a cada 8 horas, o tempo de tratamento não deve exceder 30 dias.

- 12,5 kg = 1/4 Comprimido
- 25 kg = 1/2 Comprimido
- 50 kg = 1 Comprimido

Apresentação: Caixa display hospitalar, contendo 10 blister com 10 comprimidos bissulcados cada.



12,5 kg = 1/4



25 kg = 1/2



50 kg = 1Cp



COMPOSIÇÃO

Amoxicilina tri-hidratada	574 mg
Excipientes q.s.p.....	720 mg



LINHA DE MEDICAMENTOS

ACOPROFAGIA

Suplemento com enzimas digestivas que favorecem uma absorção intestinal mais eficaz. Portanto, trata as duas causas da coprofagia: a causa relacionada a deficiência metabólica (pois contém 3 enzimas digestivas Pancreatina, Tripsina e Quimotripsina) e a causa relacionada ao problema comportamental (Glutamato Sódico) que confere à matéria fecal um sabor muito desagradável, evitando assim a ingestão das fezes pelo animal. Além disso, pode ser utilizado para tratamento de síndrome de má absorção, diarreia crônica, insuficiência pancreática, etc, pois é o único produto do mercado veterinário com Pancreatina.

Modo de usar: Produto para ser administrado por via oral. Polvilhar sobre o alimento 0,5 gramas por vez em todas as refeições. A duração do tratamento e a variação na dosagem ficam a critério do médico veterinário. Para alguns casos, pode ser necessário o uso do produto de forma prolongada ou permanente.

Apresentação: Pote com 60 g.

PREDNISOLONA

É um potente anti-inflamatório esteróide. É indicado para várias patologias: endócrinas (insuf. da glândula adrenal), musculoesqueléticas (osteoartrites, miosites), alérgicas (urticárias, dermatite alérgica) otológicas (otite extrema), respiratórias (asma) neoplásica (como terapia adjuvante), neurológicas (edema), auto-imunes (lúpus, pênfigo), oftálmicas (uveítes), gastrointestinais (colite), renais (síndrome nefrótica), hematológicas (anemia hemolítica, trombocitopenia).

Modo de usar: Indicado de 1 - 2 mg/kg.

- 1 comprimido: Animal de 20 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 10 kg (dose de 2 mg/kg)
- 1/2 Comprimido: Animal de 10kg (dose de 1 mg/kg), animal de 5 kg (dose de 2 mg/kg)
- 1/4 Comprimido: Animal de 5 kg (dose de 1 mg/kg), animal de 2,5 kg (dose de 2 mg/kg)

Apresentação: Caixa com 10 comprimidos bissulcados, Display com 10 Blisters com 10 comprimidos bissulcados de 20 mg cada Blister.



COMPOSIÇÃO

Cada 100g contem:	
Pancreatina	20,0 g
Tripsina	0,5 g
Quimotripsina	0,1 g
Glutamato Sódico anhidro	50,0 g
Excipiente q.s.p.	100,0 g



2 mg/kg



2,5 kg = 1/4



5 kg = 1/2



10 kg = 1Cp

1 mg/kg



5 kg = 1/4



10 kg = 1/2



20 kg = 1Cp



COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém	
Prednisolona.....	20 mg
Excipiente q.s.p.....	500 mg

LINHA DE MEDICAMENTOS



CEFALEXINA

Antibiótico para cães e gatos. A Cefalexina pertence a uma classe de cefalosporina de primeira geração e, por conseguinte, são eficazes contra bactérias gram-positivas e organismos gram-negativos, tais como *E. coli* e *Proteus*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Shigella* e *Enterobacter spp.*

Indicado para infecções da pele, superficial e profunda pioderma, infecções do trato urinário, nefrite e cistite. Infecções respiratórias, digestivas gastroenterite, ósseas, osteomielite, osteo, genitais, prostatite e otite externa.

Modo de usar: A posologia varia de 20 a 33 mg/kg, administrados em intervalos de 8 a 12 horas. Infecções brandas requerem de 5 a 7 dias. Infecções severas podem necessitar até 30 dias de administração, ou seja:

- 1 comprimido: 15 a 20 kg
- 1/2 de comprimido: para 10 kg
- 1/4 de comprimido: para 5 kg

Apresentação: Cx. contendo 10 comprimidos bissulcados.



COMPOSIÇÃO

Cefalexina Monohidratada.....500,0 mg



